

SÉANCE DU 24 JUIN 1898.

PRÉSIDENCE DE M. FRANCHET.

M. Lutz, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 10 juin, dont la rédaction est adoptée.

M. Micheli présente des photographies de différentes espèces d'*Eremurus* cultivées dans son jardin et entre autres de l'*E. Elwesii*, dont la hampe florale s'élève à plus de 3 mètres de hauteur. Il présente quelques remarques sur ce genre, qui appartient à la tribu des Asphodélées et compte environ 18 espèces, toutes exclusivement asiatiques. Elles se rencontrent dans le Turkestan, dans une partie de la Perse, même dans les monts Himalaya. Une douzaine d'espèces ont été introduites à l'état vivant; c'est en l'étudiant dans son jardin que M. Micheli a été amené à proposer une nouvelle subdivision du genre en deux sections bien distinctes. La première est caractérisée par les pédicelles étalés après la floraison, et par les capsules lisses. Elle renferme, entre autres, les *E. robustus*, *Elwesii*, *Himalaicus*, *Bungei*, *Olgae*, tous remarquables par la grandeur de leurs fleurs et leurs qualités ornementales.

La seconde section a les pédicelles redressés après la floraison, et les capsules généralement vidées, appliquées contre la hampe. Elle comprend, entre autres, les *E. altaicus*, *bucharicus*, *Kaufmanni*, *persicus*, *spectabilis* et *turkestanicus*: fleurs plus petites et moins brillantes.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :